

## Uitslag

De Ureumademtest gebeurt op verzoek van uw huisarts. Saltro stuurt de uitslag naar uw huisarts, die op zijn beurt u informeert. De reden hiervoor is dat uw arts bekend is met uw medische geschiedenis en de uitslag juist kan interpreteren.

## Vragen

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze stellen tijdens het onderzoek of aan uw huisarts. Ook kunt u contact opnemen met de afdeling Biometrie van Saltro via telefoonnummer 030 - 236 11 13. Meer informatie over Saltro, de locaties en openingstijden, kunt u vinden op onze website [www.saltro.nl](http://www.saltro.nl).



## Patiëntenfolder

## Ureumademtest

## Uitgave

Saltro

Ref.: BMUAT.001-I01

Versie: oktober 2011

Saltro

Postbus 9300  
3506 GH Utrecht

Tel. 030 - 236 11 32  
Fax 030 - 236 11 72

[www.saltro.nl](http://www.saltro.nl)  
[saltro@saltro.nl](mailto:saltro@saltro.nl)

# Ureumademtest

U heeft van de huisarts een verwijzing gekregen voor een Ureumademtest. Met behulp van deze ademtest kan op eenvoudige wijze bepaald worden of er een besmetting is van de maag met *Helicobacter pylori*. Deze bacterie veroorzaakt een ontsteking van het maagslijmvlies.

Het onderzoek wordt op een aantal Saltro locaties aangeboden. Welke locaties dit zijn, staat op het aanvraagformulier dat u van uw huisarts heeft gekregen. Op de website [www.saltro.nl](http://www.saltro.nl) is meer informatie te vinden over de locaties en de openingstijden.

## Zwangerschap of borstvoeding

Als u zwanger bent, een zwangerschapswens heeft of borstvoeding geeft, kan het onderzoek niet doorgaan.

## Vorbereiding

U dient nuchter naar één van de locaties van Saltro te komen. Dit betekent dat u op de avond voor het onderzoek na 19.00 uur niets meer mag eten en na 24.00 uur niets meer mag drinken. Eventuele medicijnen mag u innemen met een klein beetje water.

## Medicijnen

Medicijnen die de productie van maagzuur remmen mogen minimaal één maar liefst twee weken voor het onderzoek niet worden ingenomen. Voorbeelden hiervan zijn: Losec®, omeprazol, Nexium®, Pantozol®, pantoprazol, Pariet®, Zantac®, ranitidine, Tagamet®, cimetidine.

Medicijnen zoals Rennies®, antagel, Maalox® en Regla-pH® mogen alleen de nacht en de ochtend voor de test niet worden ingenomen.

Medicijnen tegen infecties (antibiotica zoals bijvoorbeeld penicilline) mogen gedurende een maand voor het onderzoek niet worden ingenomen.

Als u twijfelt of u wel kunt stoppen met medicijnen dient u contact op te nemen met uw huisarts.

## Wat neemt u mee

- Aanvraagformulier
- Identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart)
- Verzekeringspasje
- Medicijnen (medicatiepaspoort)

Medewerkers van Saltro zijn verplicht om de persoonsgegevens, die uw huisarts op het aanvraagformulier heeft ingevuld, en de verzekeringsgegevens te controleren.

## Verloop van het onderzoek

De test is eenvoudig en niet pijnlijk. Een capsule met een gemerkt stofje (Ureum) wordt ingeslikt. Als de maag besmet is met *Helicobacter pylori*, wordt dit stofje afgebroken en uitgescheiden in de uitademingslucht. Na inname van het gemerkt stofje moet u 10 minuten wachten en dan een aantal malen uitademen in een speciaal zakje.

## Na het onderzoek

Direct na het onderzoek mag u weer eten en drinken. U kunt zonder bezwaar zelf autorijden of met het openbaar vervoer naar huis gaan.

## Bijwerkingen

De meeste patiënten vinden de test niet belastend. Tijdens het onderzoek wordt u blootgesteld aan een zeer kleine hoeveelheid straling. Deze hoeveelheid komt overeen met een half uur vliegen in een vliegtuig en is 250 keer minder dan de hoeveelheid straling die vrijkomt bij het maken van een röntgenfoto.